

MICROLIFE BIO ZINC

BIOACTIVADOR METABÓLICO NATURAL Y FERTILIZANTE FOLIAR CON ZINC

MICROLIFE BIO ZINC es un fertilizante con Zinc y activador metabólico natural a base de algas marinas producido por innovador proceso biofermentación.

Gracias a su innovadora formulación con compuestos provenientes de la biofermentación de las algas marinas consigue que el 100% del zinc presente se encuentre de forma complejada, otorgando así una absorción extremadamente eficiente en la hoja y raíces, logrando corregir carencias de zinc en frutales, vides, hortalizas, y cultivos. **MICROLIFE BIO ZINC** está especialmente formulado para tratar todos los síntomas deficiencia de zinc en suelos ácidos y básicos tanto en pulverización foliar como aplicaciones directas al suelo.

El zinc es vital para la formación de clorofila y hormonas de crecimiento (auxinas), produciendo mayor desarrollo vegetativo y mayor rendimiento.

COMPOSICIÓN

	% p/v
ZINC (Zn)	7%
BIOACTIVADOR METABÓLICO	93%

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

FITOTOXICIDAD

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de este folleto.

ALMACENAMIENTO

MICROLIFE BIO ZINC debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación Foliar:

- Cítricos, frutales y vid : 200 cc/100 litros de agua (2-4 litros/ha)
- Hortalizas y Cultivos : 200 cc/100 litros de agua (2-3 litros/ha)

Aplicación Radicular (Fertirrigación):

- Cítricos, frutales y vid : 3-5 litros/ha
- Hortalizas y Cultivos : 2-3 litros/ha

Aplicación Aérea:

- Cítricos, frutales y vid : 2 litros/ha
- Hortalizas y Cultivos : 2 litros/ha

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Concentración (cc/100 L agua)	APLICACIÓN
Manzanos, Perales, Membrillos	2-4	200 cc/hl	Aplicar en apertura de yemas. A partir de 6 semanas después de caída de pétalos y repetir según necesidad en intervalos de 14 a 21 días hasta un mes antes de la cosecha. En postcosecha antes del inicio de caída de hojas.
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Paltos.	2-4	200 cc/hl	Aplicar en inicios de brotación en de otoño y primavera.
Durazneros, Nectarinos, Cerezos, Ciruelos, Damascos, Avellano y Olivo	2-4	200 cc/hl	Aplicar en yema hinchada y repetir en botón floral. Aplicar desde fruto cuajado cada 2 a 3 semanas hasta un mes antes de la cosecha. En Postcosecha aplicación antes de inicio senescencia de las hojas.
Almendros, Nogal	2-4	200 cc/hl	Aplicar a inicios de flor, repetir aplicación con brote de 15-18 cm. Aplicar dosis mayor en post cosecha a 30 días antes del inicio de caída de hojas.
Uvas de mesa, Uva vinífera.	2-4	200 cc/hl	Aplicar 20 días antes de inicio de flor y repetir a los 15 días.
Kiwis	1-2-4	200 cc/hl	Aplicar desde brote de 15 cm, cada 15 días
Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Grosellas, Zarzaparrillas	2-4	200 cc/hl	Aplicar 1 a 2 veces preferentemente antes de floración.
Hortalizas: Lechugas, Endivias, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Zapallos, Coliflor, Zanahorias, Alcachofas, Pepinos, Melones, Sandías, Pimientos, Tomates, Aji	2-3	200 cc/hl	Estados temprano de crecimiento con cubrimiento adecuado.
Trigo, Avena, Arroz (cereales)	1,5-2	200 cc/hl	Desde brote activo y repetir cada 10 a 15 días.
Papas	2-3	200 cc/hl	Aplicar una semana después de que ha emergido el 100% del cultivo. Con deficiencias moderadas repetir 10 a 14 días después
Cebollas, Ajos, flores bulbosas	2-3	200 cc/hl	Aplicar 30 y 60 días después del trasplante.
Maíz	2-3	200 cc/hl	Aplicar a partir de 3 a 8 hojas, repetir a inicios de panoja
Espárragos	1,5-2,0	200 cc/hl	Aplicar 15 días después de la apertura del meristema apical, repetir a los 20 días.
Maravilla	1,5-2,0	200 cc/hl	Aplicar desde 2 hojas a capítulo expuesto. Repetir a los 10-14 días.
Remolacha	1,5-2,0	200 cc/hl	Aplicar desde 4 a 6 hojas.
Raps	1,5-2,0	200 cc/hl	Realizar la 1ª aplicación en estado de roseta junto a Microlife Bio® Boro, y la 2ª aplicación a inicio de flor junto a Microlife Bio Boro
Alfalfa	1,5-2,0	200 cc/hl	Aplicar inicio crecimiento activo y después de cortes
Plantas ornamentales (rosas, claveles, etc.)	2,0	150 cc/hl	Aplicar a inicios de crecimientos de brotes.

PRESENTACIÓN

Envases de 1-5-20-200-1000 litros.



Producto compatible con (CE) N° 889/2008 (UE), NOP 7 CFR Part. 205 y JAS/MAF para uso en cultivos orgánicos como Fertilizante.



Control ECOCERT SA F – 32600 Aprobado por ECOCERT para uso en agricultura orgánica de acuerdo a la Regulación EC N° 834/2007 y 889/2008, USDA, AMS 7 CFR Parte 205, NOP, Regla Final y Ley Japonesa JAS.